

- Les appâts doivent être disposés de manière à minimiser le risque d'ingestion par d'autres animaux.
- Sécuriser les appâts afin qu'ils ne puissent pas être emmenés par les rongeurs.
- La zone de traitement doit faire l'objet d'un marquage pendant la période de traitement. Le risque d'empoisonnement (primaire ou secondaire) par l'anticoagulant, ainsi que son antidote doivent être mentionnés.
- Les rongeurs morts doivent être retirés quotidiennement de la zone de traitement pendant toute la période du traitement. Ne pas les jeter dans les poubelles ni les décharges.

Réglementation

- Ces appâts sont utilisables uniquement par des applicateurs professionnels. Ils ne peuvent être utilisés que dans les lieux ou abris couverts, et en cas de nécessité à leurs abords immédiats.
- Sécuriser les appâts afin qu'ils ne puissent pas être emmenés par les rongeurs.
- La zone de traitement doit faire l'objet d'un marquage pendant la période de traitement. Le risque d'empoisonnement (primaire ou secondaire) par l'anticoagulant, ainsi que son antidote doivent être mentionnés.
- Les rongeurs morts doivent être retirés quotidiennement de la zone de traitement pendant toute la période du traitement. Ne pas les jeter dans les poubelles ni les décharges.

TALON® BLOC **AMM 9300202**

Usages autorisés	Lutte contre les rats et les souris - AMM N° 9300202
Composition	0.004 % (m/m) de Brodifacoum (CAS n° 56073-10-0)
Formulation	BB : appât en blocs de paraffine attractifs de 20 g
Classement toxicologique	Xn - Nocif ; R22 : Nocif en cas d'ingestion.
Conditionnement	Seau de 10 kg



PP87 - pao - Edition février 2013 - © 2013



Syngenta Agro S.A.S, 1 avenue des Prés - CS 10537 - 78286 Guyancourt Cedex - Tel : 01 39 42 20 00 ; Fax : 01 39 42 20 10.
Capital social de 22 543 902,80 Euros ; SIREN B 433 886 934 RCS Versailles.
Agrément IF01749 : distribution de produits phytopharmaceutiques à des utilisateurs professionnels. TVA FR63433886934.
TALON® Bloc - AMM 9300202 - Composition : 0.004% brodifacoum - Xn - Nocif - R22.
© Marque enregistrée et substance active d'une société du groupe Syngenta.
Pour les usages autorisés, doses, conditions et restrictions d'emploi : se référer à l'étiquette du produit.

PRODUITS POUR LES PROFESSIONNELS : UTILISEZ LES PRODUITS BIOCIDES AVEC PRÉCAUTION. AVANT TOUTE UTILISATION, LISEZ L'ÉTIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT.



Le rodenticide le plus puissant pour les professionnels

- **TALON BLOC** est un puissant rodenticide anticoagulant actif à faible dose contre les rongeurs (souris, rats noirs et surmulots), **y compris les souches résistantes aux autres anticoagulants.**
- Une seule ingestion (prise unique) est généralement mortelle. La mort intervenant de 3 à 7 jours plus tard, **TALON BLOC** n'éveille donc pas la méfiance des rongeurs. L'appâtage préliminaire n'est pas nécessaire.
- **TALON BLOC** est un bloc hydrofuge de 20 grammes parfaitement adapté pour être utilisé dans les endroits humides. Il est percé en son milieu ce qui permet de le fixer solidement dans le poste d'appâtage.




● **TALON BLOC** est aussi efficace sur rats que sur souris


■ DL50 de plusieurs anticoagulants de deuxième génération sur *Rattus norvegicus* Albinos.

■ DL50 de plusieurs anticoagulants de deuxième génération sur *Mus domesticus* Albinos.

DL 50 (g d'appât/rat de 250 g)





DL 50 (g d'appât/souris de 25 g)




● La puissance du brodifacoum est telle que les rongeurs peuvent ingérer une dose mortelle en une seule prise qui correspond à moins de 10 % de la consommation journalière normale du rongeur.

■ Consommation totale de nourriture 25 g, dose mortelle de TALON BLOC 1,4 g (soit 5,6% de la consommation totale).

■ Consommation totale de nourriture 3 g, dose mortelle de TALON BLOC 0,24 g (soit 8% de la consommation totale).



● Avec une prise d'appât initiale de **TALON BLOC** aussi importante que pendant le recensement pré-traitement (avec un appât non actif), la population de souris est fortement réduite à partir du 4ème jour de prise d'appât. L'activité des rongeurs cesse complètement au bout de 15 à 20 jours.



● **TALON BLOC** doit être utilisé dès l'apparition des rongeurs. Tout retard d'application rend le problème plus difficile et plus coûteux à résoudre.

■ Quelques règles à respecter pour un contrôle efficace

Inspecter le site	Repérer les empreintes, crottes, traces de passage, parties rongées ; accorder une attention particulière aux trous de rats et nids de souris, à proximité des points d'eau, des débris et repérer les points d'entrées des rongeurs dans les locaux à traiter.
Etablir la stratégie d'intervention	Etablir un plan précis de la zone en indiquant les endroits où une activité des rongeurs a été établie et positionner les postes d'appâtage sécurisés en conséquence.
Utiliser la bonne quantité d'appât	Compte tenu du niveau d'efficacité et pour éviter de gaspiller du produit, placer les appâts en quantité plus faible que les anticoagulants conventionnels. Pour les rats : déposer les blocs aux endroits régulièrement fréquentés par les rats : 1 à 3 blocs (de 20 à 60 g) tous les 5 à 10 mètres selon le niveau d'infestation. Pour les souris : déposer les blocs aux endroits régulièrement fréquentés par les souris : 1 bloc (20 g) tous les 1 à 3 mètres selon le niveau d'infestation.
Sécuriser la disposition des appâts	Les blocs doivent être placés dans des boîtes d'appâtage sécurisées accessibles uniquement aux rongeurs. Un trou situé au centre de chaque bloc permet un ancrage facile de ce dernier dans le poste d'appâtage.
Assurer l'efficacité de l'opération	Quel que soit le rongeur ciblé, contrôler les postes d'appâtage fréquemment (tous les 7 jours en cas d'intervention curative) et remplacer les blocs consommés, jusqu'à ce qu'ils restent intouchés.
Prévenir une nouvelle infestation	TALON BLOC peut être utilisé en poste semi permanent aux endroits stratégiques pour se prémunir d'une éventuelle infestation.