

# TRICO® Répulsif cervidés



## DESCRIPTIF PRODUIT

Répulsif, agent de prévention des dommages causés par les cervidés : protection longue durée contre les dégâts de cerfs et chevreuils en forêt.

<b>Composition</b>	Graisse de mouton 64,6 g/L (6,4% m/m)
<b>Cible</b>	Cervidés (cerfs, chevreuils)
<b>Usages autorisés</b>	Professionnels
<b>Lieux d'utilisation</b>	Jeunes pousses et parties végétales susceptible d'être attaquées.
<b>Référence(s)</b>	RE-ORE-05019-TRICO Flacon de 1L (carton de 6 flacons) RE-ORE-05021 - TRICO Bidon de 5L (carton de 4 bidons) EQ-OEQ-01011 - Diffuseur Carton de 50 pièces

## INFORMATIONS COMMERCIALES

- Répulsif concentré à action olfactive et gustative contre les attaques de cervidés.
- **Pulvérisation du produit pur ou dilué** : Appliquer TRICO® sur les jeunes pousses et les parties végétales susceptibles d'être attaquées par les cervidés. Pour d'importantes superficies et en cas de faible pression, l'application de TRICO® en bordure de parcelle sur 5 à 10 m (partie intérieure de la parcelle) peut être suffisante.
- **Utilisation de diffuseurs** : en préventif (dans les cas récurrents préférer la pulvérisation) sur le pourtour des parcelles (1 tous les 8 m plus 1 à chaque entrée de rangée) permet d'utiliser TRICO® sans devoir pulvériser la végétation. Chaque diffuseur contient environ 5 cl de produit (pur non dilué). La durée de diffusion dépendra de la température (de 6 à 8 semaines).

## METHODE D'APPLICATION

Culture	Stade	Dose/Ha	Dilution & préco	Nb application	Intervalle entre application
Forêts	Toute saison	5 à 10L/ha suivant la plantation	Toute saison	1	
Viticulture	2 feuilles jusqu'à floraison	10 L	1 pour 3l d'eau Environ 6 m par plant, pied à pied	2	4-6 semaines
Maïs, soja, tournesol, colza	3 feuilles jusqu'à floraison	10 L	1 pour 15 L d'eau	4	4-6 semaines